YPF agro

FITOSANITARIOS

HERBICIDAS

FOMESAFEN

DESCRIPCIÓN

FOMESAFEN es un herbicida post-emergente para el control de malezas de hoja ancha en los cultivos de soja, maní y poroto. Actúa por contacto, por lo que se debe realizar una buena aplicación para lograr buena cobertura de las malezas y asegurar los mejores resultados.
También puede usarse en pre-emergencia del cultivo de soja, aplicado en combinación con cloroacetamidas (acetoclor, metolaclor, etc.), para el control de malezas de hoja ancha. En este caso actúa en forma sistémica, siendo absorbido por las raíces de las plantas.

DATOS BÁSICOS

- **NOMBRE COMERCIAL**
  FOMESAFEN
- **CATEGORÍA**
  FITOSANITARIOS
- **FAMILIA**
  HERBICIDAS
- **PRESENTACIÓN**
  BIDÓN DE 20 LITROS

CONCENTRACIÓN

FOMESAFEN 25 GRAMOS/100 ML

FORMULACIÓN

FORMULADO COMO CONCENTRADO SOLUBLE (CS)
FOMESAFEN

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Modo de acción: inhibidor de Protox (PPO)
- Herbicida selectivo, post-emergente de contacto
- Absorbido por hojas y raíces
- Controla principalmente malezas de hoja ancha
- Herramienta altamente efectiva para el manejo de yuyo colorado resistente en cultivos de soja, poroto y maní
- Se recomienda la aplicación con ADYUVANTE 80 YPF

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

CULTIVO	DOSIS (litros/hectárea)	
Post-emergencia		
Abrojo grande (*Xanthium cavanillesii*)	Hasta 4 hojas	1,35
Bejuco o Campanilla (*Ipomoea spp.*)	Hasta 5 cm (4 hojas)	1,35
Cepa caballo (*Xanthium spinosum*)	Hasta 4 hojas	1
Chamico (*Datura ferox*)	Hasta 5 cm	0,70
	Hasta 10 cm	0,90
	Hasta 20 cm	1,15
Chinchilla (*Tagetes minuta*)	Hasta 10 cm	1
Cuerno del diablo (*Ibicella lutea*)	Hasta 4 hojas	1
Farolito (*Nicandra physaloides*)	De 4 a 6 hojas	0,80
Girasolillo (*Verbesina encelioides*)	Hasta 5 cm	0,80
	Hasta 15 cm	1
Lagunilla (*Alternanthera philoxeroides*)	Hasta 5 cm	1
Lecherón (*Euphorbia heterophylla*)	2-4 hojas	1,50
Malva cimarrona (*Anoda cristata*)	Hasta 5 cm (4 hojas)	1,35
Nabo (*Brassica campestris*)	Hasta 4-5 hojas	0,70
	Más de 5 hojas	0,90
Pasto cubano (*Tithonia tubaeformis*)	Hasta 10 cm	0,80
Quinoa o Yuyo blanco (*Chenopodium album*)	Hasta 5 cm (4 hojas)	1
Saetilla (*Bidens pilosa*)	Hasta 10 cm	1
Yuyo colorado o Ataco (*Amaranthus quitensis*)	Hasta 5 cm	0,90
	Hasta 10 cm	1,15
	Hasta 20 cm	1,35
Verdolaga (*Portulaca oleracea*)	Hasta 5 cm	0,70
	Más de 5 cm	0,90

YPF agro

FITOSANITARIOS HERBICIDAS FOMESAFEN

CULTIVO	DOSIS (litros/hectárea)
Pre-emergencia	
Alkekenje (*Physalis angulata; P. pubescens*) Bejuco o campanilla* (*Ipomoea nil*) Bejuco o campanilla (*Ipomoea purpurea*) Capín arroz (*Echinochloa crus galli*) Cola de zorro (*Setaria spp.*) Chamico* (*Datura ferox*) Chinchilla (*Tagetes minuta*) Escoba dura o afata (*Sida rhomibifolia*) Escoba dura o afata hembra (*Sida spinosa*) Malva cimarrona (*Anoda cristata*) Pasto de cuaresma (Digitaria sanguinalis) Quinoa o yuyo blanco (*Chenopodium album*) Saetilla (*Bidens pilosa*) Sorgo de Alepo de semilla (*Sorghum halepense*) Yerba de pollo (*Richardia brasiliensis*) **Yuyo colorado o ataco** (Amaranthus spp.)** Yuyo sapo o clavel amarillo* (Wedelia glauca)	**Suelos livianos** (con bajo contenido de materia orgánica): 0,75 litro/ha + 0,75 litro/ha de acetoclor 90% p/v EC **Suelos medios o pesados** (con alto contenido de materia orgánica): 1 litro/ha + 1 litro/ha de acetoclor 90% p/v EC

Restricciones de uso.
Período de carencia: dejar transcurrir 60 días entre la última aplicación y la cosecha del cultivo. En caso que el cultivo o sus subproductos se destinen a la exportación, deberá conocerse el límite máximo de residuos del país de destino y observar el período de carencia que corresponda a ese valor de tolerancia.
Rotaciones. Con inviernos muy secos y suelos livianos o con bajo contenido de materia orgánica, no sembrar sorgo por un período de doce meses desde la aplicación. En rotaciones con girasol, maíz o cereales de invierno puede presentarse una fitotoxicidad inicial del cultivo. Si por alguna razón se malogra el cultivo, resembrar únicamente soja.

MANIPULEO Y ALMACENAJE

Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de personas inexpertas y animales.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANIPULEO

Utilizar los elementos de protección persona (EPP) para el manipuleo y dosificación del producto que se indican en la base del marbete.

Obtené el mejor asesoramiento y las mejores condiciones comerciales en tu YPF Agro más cercano.

RECOMENDACIÓN

Se aconseja el asesoramiento con un ingeniero agrónomo antes de su empleo sobre la oportunidad del mismo, factores ambientales, agua y equipos a utilizar.

ypfagro.com.ar

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE CON SU TÉCNICO O INGENIERO AGRÓNOMO.