FITOSANITARIOS

HERBICIDAS

HALOXIFOP CONCENTRADO

DESCRIPCIÓN

Es un herbicida post-emergente de acción sistémica selectivo para cultivos de soja, girasol, maní, poroto y algodón. Controla malezas gramíneas perennes y anuales. Las malezas tratadas con HALOXIFOP CONCENTRADO detienen su crecimiento y las hojas muestran a los pocos días de la aplicación, tonalidades violáceas, amarillas y finalmente marrones. En los rizomas destruye inicialmente las yemas y luego el tejido se necrosa.

DATOS BÁSICOS

- **NOMBRE COMERCIAL**
  HALOXIFOP CONCENTRADO
- **CATEGORÍA**
  FITOSANITARIOS
- **FAMILIA**
  HERBICIDAS
- **PRESENTACIÓN**
  CAJA CON 4 BIDONES DE 5 LITROS

CONCENTRACIÓN

HALOXIFOP-P-METIL
520 GRAMOS I.A./LITRO

FORMULACIÓN

FORMULADO COMO EMULSIÓN CONCENTRADA (EC).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Disponible en concentracón 54% (Inhib. ACCasa)
- Ideal para control de maíz voluntario (RG) en cultivos de soja (RG).
- Compatible con insecticidas a base de clorpirifos y/o cipermetrinas.

Se recomienda su aplicación con aceites (mineral o vegetal) preferentemente utilizar el ADYUVANTE 80 de YPF para óptimo control.

RECOMENDACIONES DE APLICACIÓN

CULTIVO	MALEZAS	DOSIS 54%	MOMENTO DE APLICACIÓN
Algodón Girasol Maní Soja Poroto	Capín (*Brachiaria plantaginea*) Cola de zorro *(Echinochloa spp.)* Pasto de cuaresma *(Setaria spp.)* Pasto morado *(Digitaria sanguinalis)* Pie de gallina *(Leptochloa filiformis)* *(Eleusine indica)*	0,08 - 0,12 litros/ha	Cuando la maleza tiene de 2 a 4 hojas hasta 1 macollo
	Gramón, Gramínea, Pasto bermuda, Pata de perdiz	0,23 - 0,29 litros/ha	Aplicar con estolones de 8-15 cm
	Sorgo de Alepo de rizoma *(Sorghum halapense)*	0,12 - 0,15 litros/ha	Cuando el Sorgo de Alepo tiene 20-40 cm de altura
	Sorgo de Alepo de semilla *(Sorghum halapense)*	0,08 - 0,12 litros/ha	Cuando el Sorgo de Alepo tiene 10-15 cm de altura
	Maíz guacho tolerante a glifosato	0,08 - 012 litros/ha	Cuando tiene 10-15 cm de altura

RESTRICCIONES DE USO

El producto no debe ser aplicado en casos de sequías. Aplicar en horas de baja insolación. Evitar las altas temperaturas. No aplicar cuando las malezas presenten síntomas de marchitez

MANIPULEO Y ALMACENAJE

Mantener el producto en su envase original cerrado, en un lugar seguro, fresco, seco y al resguardo de la luz solar, ubicado fuera del alcance de per¬sonas inexpertas y animales. No transportar ni almacenar con alimen tos, fertilizantes, otros plaguicidas y semillas. Evitar almacenar a temper turas por encima de 35 ºC.

PROTECCIÓN PERSONAL PARA EL MANIPULEO

Utilizar los elementos de protección persona (EPP) para el manipuleo y dosificación del producto que se indican en la base del marbete.

RECOMENDACIÓN

Se aconseja el asesoramiento con un ingeniero agrónomo antes de su em pleo sobre la oportunidad del mismo, factores ambientales, agua y equipos a utilizar.

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE CON SU TÉCNICO O INGENIERO AGRÓNOMO.

Obtené el mejor asesoramiento y las mejores condiciones comerciales en tu YPF Agro más cercano.

ypfagro.com.ar