FICHA TÉCNICA

YPF agro

BIOESTIMULANTE

TRATAMIENTO FOLIAR

Y-TERRA BIOLÓGICO POTENCIADOR FOLIAR

ATRIBUTOS

- Producto biológico de alta efectividad y fácil aplicación.
- Atenúa el efecto fitotóxico asociado al uso de herbicidas con distintos niveles de selectividad
- Potencia la acción generada por fungicidas
- Estimula el sistema inmunológico del cultivo y la acumulación decompuestos antioxidantes y antifúngicos.
- Favorece la respuesta del cultivo frente a situaciones de estrés abiótico
- Mejora la eficiencia fisiológica general del cultivo impactando enrendimiento.

DATOS BÁSICOS

- **NOMBRE COMERCIAL:**
  Y-TERRA BIOLÓGICO POTENCIADOR FOLIAR
- **CATEGORÍA:**
  TRATAMIENTO FOLIAR
- **PRESENTACIÓN:**
  20 LITROS (2 VEJIGAS x 10 LITROS)
- **COMPOSICIÓN:**
  Formulado a base de metabolitos, principalmente fitohormonas (auxinas, citoquininas y giberelinas) y aminoácidos, obtenidos a partir del cultivo de un aislado específicode *Trichoderma harzianum*
- **INSTRUCCIONES:**
  - ✓ Agitar cada vejiga antes de utilizar.
  - ✓ El caldo de aplicación se prepara diluyendo el producto Y-TERRA BIOLÓGICO POTENCIADOR FOLIAR en agua; se agrega un coadyuvante compatible para favorecer la adherencia y distribución de la mezcla en la parte aérea del cultivo. El volumen final del caldo se definirá en función de lo requerido para asegurar la cobertura del área de interés durante la etapa de pulverización. Este producto puede aplicarse en forma combinada con herbicidas y fungicidas.

.

RECOMENDACIONES DE USO

CULTIVO	DOSIS (l/ha)	ESTADIO DE APLICACIÓN
Ajo/Cebolla	1,5 - 3	Desde 3-4 hojas verdaderas hasta bulbificación
Algodón	1,5 - 3	Aplicar ante aparición de síntomas de fitotoxicidad de herbicidas Repetir aplicación a los 15 días frente a síntomas severos
Caña de Azúcar	1,5 - 3	Macollaje frente a post estrés primaveral (PEP)
Girasol	1,5 - 3	Inicio de Botón Floral (R1)
Maíz	1,5 - 3	Se recomienda su aplicación en conjunto con herbicidas
Maní	1,5 - 3	Se recomienda su aplicación en conjunto con fungicidas
Papa	1,5 - 3	Se recomienda su aplicación en conjunto con fungicidas
Soja	1,5 - 3	1 aplicación en R1 – R3 Se recomienda su aplicación en conjunto con herbicidas
Tomate	1,5 - 3	Tomate industria: a partir de los 20 días desde el trasplante. Repetir a los 30 días posteriores Tomate fresco: a partir del inicio de la floración de las primeras coronas, repetir semanalmente
Trigo y cebada	1,5 - 3	1 aplicación Fin de macollaje (Z31) a hoja de bandera (Z39). Se recomienda su aplicación en conjunto con fungicidas y/o herbicidas.
Vid	1,5 - 3	Brote de 40 cm hasta cosecha. Se recomienda su aplicación en conjunto con fungicidas

PELIGRO: SU USO INCORRECTO PUEDE PROVOCAR DAÑOS A LA SALUD Y AL AMBIENTE. LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA. ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTE CON SU TÉCNICO O INGENIERO AGRÓNOMO.

Obtené el mejor asesoramiento y las mejores condiciones comerciales en tu YPF Agro más cercano.